...DAM CAPITA EX COMMENTATIONE AMPLIORE

DE

...HILIDE EJUSQUE CURATIONE ANTIPHLOGISTICA

...UNDUM OBSERVATIONES IN PRAXI NOSOCOMIALI.

DISSERTATIO

INAUGURALIS MEDICO-PRACTICA

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

...RATIOSI MEDICORUM ORDINIS

IN

ALMA LITERARUM UNIVERSITATE

FRIDERICA GUILELMA

UT SUMMI

...MEDICINA ET CHIRURGIA HONORES

RITE SIBI CONCEDANTUR

DIE I. MENS. JUNII A. MDCCCXXXVIII

H. L. Q. S.

PUBLICE DEFENDET

AUCTOR

...L. ARTHUR. RAFFALOWITSCH

RUSSUS ODESSAEUS.

OPPONENTIBUS:

DE MIDDENDORFF, MED. DR. UNIV. CAESAR. DORPATENS.
HEIBERG, DR. PROSECT. IN UNIV. REG. NORVEG. CHRISTIAN.
AB ETLINGER, MED. ET CHIRURG. CAND.

BEROLINI,

TYPIS JULII SITTENFELD.

Nulli prae aliis addictum M

Max. St

VIRO

[C]ELSISSIMO, ILLUSTRISSIMO, NOBILISSIMO

COMITI

[M]ICHAIL SEMIONOWITSCH

WORONZOFF,

[...]e Russiae et Bessarabiae Gubernatori Generali, Exercitus pede-
[...]Duci Supremo, Imperatoris Caesareae Majestati jussorum feren-
[...]a Ministro summo, Consilii Supremi Imperii Rutheni membro,
[...]nis militaris venatorum Narvensium Duci; Ordinum inclytorum
[...]orum Sti. Andreae cum insignibus adamanteis, Sti. Alexandri
[...]ki cum insignibus adamanteis, Sti. Wladimiri in Classe I., Sti.
[...]gii in Classe II. magnae crucis, Stae. Annae in Classe I. cum
[...]nibus adamanteis — Exterorum: Gallici Sti. Ludovici, Angli Ba-
[...]is, Borussici Aquilae Rubrae in Classe I., Sardensis Sti. Mauritii
[...]azari in Classe I., Suecici Gladii, Hanoverani Guelphorum, Au-
[...]ci Mariae Theresiae in Classe III. Equiti; gladiis praeterea deco-
aureo adamantibus ornato atque „propter Warnam occupatam‘,
[...]ripto, nec non aureo „propter virtutem“ inscripto, etc. etc. etc.

NEC NON

PATRI

OPTIMO, CARISSIMO, DILECTISSIMO

RAFFALOWITSCH

HASCE

STUDIORUM PRIMITIA

PIO GRATOQUE ANIMO

D. D. D.

AUCTOR.

I. INTRODUCTIO HISTORICA.

ae nostris temporibus partes belligerantes vastum Syphi- occupant campum: utraque aeque persuasum habens de tate *suae* opinionis, aequali utraque certitudine et perti- a verbis et scriptis certans, utraque aeque factiosa et in- m se excludens! — Prima earum — huc pertinent sec- res *veteris* sic dictae *scholae* — tot saeculorum inni- experientiae, innumerabilibus omnium aetatum obser- onibus, clarissimorum in arte medica virorum auctoritati; ilidem morbum esse docet *specificum*, sui generis, quod phaenomena et sequelas ab omnibus ceteris differentem, exorta infectione, initio semper *locali*, mox per resor- nem materiae peccantis, *virus syphiliticum* a multis cupatae, totum organismum, totam substantiam in con- sum trahat, peculiaria, et alias nusquam, eodem saltem ine nusquam occurrentia symptomata producat *consecutiva*, s naturae viribus absque artis auxilio nunquam ad sani- m redeuntia. Morbum hunc, vetus contendit doctrina, m nonnulli semper inter homines extitisse, alii vero unte demum saeculo XV, et quidem epidemice inter rcitus multis laboribus et inopia defatigatos se manifestasse umant — tanquam affectionem specificam, sine analogo in versa nosologia, non nisi curae cedere specificae, *remedio ecifico*, cujus effectus principiis generalibus explicari non sit, quod tamen affinitatem chemico-vitalem cum veneno hilitico habeat, itaque actionem ejus organismo infestam eat et per excretiones criticas hunc in integrum reducat, xime est verisimile. *Mercurium* denique hoc remedium e docet, cujus diversissima praeparata diversissimis formis jus opinionis asseclae administrant.

E diametro illi opposita est theoria partis, quae *novae* i *scholae* nomen vindicat. Pauci quidem tantum inde ab

origine hujusce elapsi sunt anni, sed exortam se esse af
mat ex sententiis clarioribus recentioris medicinae, nullas
ad hypotheses recurrere velle, solamque physiologiam pro t
agnoscere: quapropter indolem syphilidis specificam omn
negat — causas, decursus et exitus illius certe peculiares e
sed tantum quatenus unusquisque morbus characterem hab
constantem; solas tantum rationes physiologicas corporis nos
solas sympathias, quas semper in variis illius invenimus
ganis, aliquam in syphilidem exercere vim; ab illis tantu
non a veneno specifico, phaenomena pendere et explicari
dicta consecutiva, cum notio veneni, qualem hydrargyropl
concipiunt, minime accipi possit, sed quasi residuum barba
rum illorum temporum, quibus vivus organismus pro reto
habebatur chemica, rejicienda sit. Quam ob causam qua
cunque remedium indagare specificum, supervacuum esse, qu
multo tutius, citius et jucundius morbum secundum le
generales therapiae sanare possimus; et quod ad mercuri
remedium antisyphiliticum κατ' ἐξοχὴν spectet, hoc me
camentum tam heroicum, tam differens et organismo ta
inimicum, eo magis respuendum esse nova praetendit scho
quod huic ***soli horrenda, olim syphilidi adscrip***
symptomata consecutiva, ossium affectus et devast
tiones foedae faciei tribuenda sint. Quumque plurin
syphilidis phaenomena, praecipue primaria, cum inflammatio
juncta sint, haec doctrina nonnisi communia adhibet ***remedi***
antiphlogistica et hoc modo sat prophylaxeos coaffectio
totius organismi sese opposuisse credit. Propterea method
haec ***antiphlogistica*** salutatur (traitement simple, simp
treatement).

Talis est praesens opinionum medicorum conditio. Nu
consideremus causas, quae tam subito illos impellere potuerin
ut a more consueto a majoribus tradito discederent, cura
priorem vix non arithmetice constitutam relinquerent, omn
busque fallaciis et discriminibus novorum experimentoru
sese concrederent. Conemur paucis progressum hujus aposta
siae medicae (sit venia verbo) diligentius eruere — eumqu
in finem examinemus tam statum artis nostrae in saecul
superiori, quam societatis humanae in genere: tunc enin
necessitas novae methodi nobis perspicua fiet; pro ***rea***
ctione nempe haberi debet, quales tam saepe in histori

nimus gentium. Omnis enim quamlibet in partem actio ntrica secum jam conditiones similis fert renisus, qui ipse magis ad extremum tendit, quo illa longius a recto abiit io, utraque extrema e proelio non prius discedent, quam r ea diuturnitate pugnae defessa, aequilibrium restituatur.

Quare mirandum non est et novam doctrinam minime, ti fautores ejus contendunt, nimia non postulare: hoc in m natura positum! Mirandum non est, illam syphilidis blem specificam negare, mercurium absolute nocentem, irntem, incendiarium existimare solique illi ossium affectiones uere — quum contra medicamen hoc tanta cum efficacia ine ulla noxa aliis in morbis adhibeatur inflammatoriis, nicis aeque ac acutis, quumque ossium affectus post inionem syphiliticam et ibi inveniamus, ubi nullam quaereaeger curam, ut saepe ruri, vel in regionibus septentriibus, ubi affectiones hae quamlibet sequuntur haud raro ndi methodum: Mercurii adversarii semel novam, quam erunt, viam ingressi, ulterius non procedere non potuerunt que praevidendum erat, mox scepticos prodituros, qui, ti naturam specificam rejecerunt syphilidis, indolem deniejus contagiosam contra quotidianam experientiam denent: juvenes temerarii in Gallia et Anglia in suo corpore ulationem syphilidis experti sunt quam tristis in multis ta est poenitentia. »On a elevé des doutes récents r la contagion de la Syphilis, Rostan nobis narrat (1) malheureuses expériences ont été tentées par de jeunes méraires dans le but de prouver que le virus syphilitique existait pas, quelquesunes ont été suivies d'un repentir ner. Ib est plus que vraisemblable que les auteurs de ces inions refuseraient de s'exposer à un coït impur.«

Irrequietae mentis humanae est, nunquam neque in vetis indagatione neque in aberrationibus metas agnoscere!..

Postquam enim Fernelius (n. a. 1497 † 1558) msi adversarius acerbus mercurii, cujus actiones nocentes abusu frictionum illis temporibus saepissime et absque ericordia adhibitarum didicerat, primus venenum syphilitia existere docuit (2), et Guajacum ut summum certissi-

(1) Cours de médecine clinique, art. *syphilis*.
(2) vid. Desruelles Traité pratique des maladies vénérien-; Paris 1836. 8vo; Ire part.

mumque remedium ad hoc ex corpore expellendum lauda[v] et postquam Astruc (n. a. 1684 † 1766) iste »romanc »des maladies vénériennes« secundum Jourdan, ad virus s[y]philiticum definiendum multas excogit averat hypotheses, ill pro acido, vel salso et lympham inspissante habuerat, itaq actionem explicavit mercurii, qui pondere mechanico viscid discutiat humores, secretiones provocet et hoc modo vir ex organismo educat — postquam haec omnia facta sun inter medicos sensim opinio vigere coepit, virus syphiliticum quod nemo jam in dubium vocabat, semel in corpus intı ductum nunquam penitus ex illo eliminari posse, nunqua morborum syphiliticorum sanationem perfectam fieri, vir venereum serius ocius variis sub formis denuo in lucem pr dire eoque correptos etiamsi restituti videantur, virus nihilon nus soboli suae per hereditatem relinquere.

Sic Baglivi a Desruelles citatus (1) »affectionem s »philiticam, semel in corpus receptam, difficillime expe »posse contendit, illam interdum mitigari, extingui vero nu »quam!« — Eandem sententiam defendit Sanchez, medic Lusitanus (n. a. 1699 † 1783), qui 40 annorum exp rientia edoctus »a syphilide nunquam sanari posse adfirma »illam in succos transire et in perpetuum inficere; chron »cas aetatis provectioris affectiones nonnisi sequelas es »morbi apud homines juvenes adhuc et robustos per specie »tantum sanati.« — Desruelles vehementissime in h invehitur effatum, quod *absurdum* vocat (2), veritatem eju penitus rejiciens; at vero quis infitias ibit crebros in vene excessus et frequentissimas juvenilis aetatis infectiones syph liticas, corporis sensim destruere constitutionem et tot tanti que senectutis malis ansam praebere?

Mox autem ulterius medici progressi sunt; haud eni contenti, virus in corpus receptum pro indelebili declare — illius etiam in aegris praesentiam suspicari coeperunt, quo rum morbi cum venereis *similitudinem* habebant, null tamen confirmata antecedente infectione; quod vero pessimu erat, huic hypothesi innixi antisyphiliticis, periculosis sub jiciebant curis mercurialibus aegrotos, in quibus virus adess

(1) libr. cit. p. 45. (Edit. de Brux.)
(2) libr. cit. pag. 63.

iecerunt, et ita illis non minus, quam ipsae scientiae no-
e nocuerunt, quae hoc modo omnem amisit normam re-
tu aetiologiae et decursus syphilidis. Sic legimus apud
senstein (1) (n. a. 1706 † a. 1773) longam morbo-
enumerationem, quorum sub specie virus syphiliticum
abscondere possit, quique secundum auctores sint: Cepha-
ia, ophthalmia, coecitas, otalgia, surditas, ozaena, an-
e, aphthae, raucedo, tussis, pleuritis, haemoptysis, asthma,
isis, dysenteria rubra, coxalgia, fluor albus, hectice, atro-
, febris tertiana et quartana, debilitas articulorum, rheu-
ismus, podagra, convulsioues, epilepsia. — Rosenstein
terea multas nobis aegrotorum narrat historias, ubi virus
ereum plures, et quidem *triginta* annos et amplius in
ore latuerit, antequam sese manifestaverit, quos casus
otenus transcribo ex versione Murray: „Ein 2jähriges
ädchen wurde von ihrer Magd angesteckt, die Essen für
kaute, und an der man hernach große Geschwüre an
m Körper und andere zuverlässige Zeichen des veneri-
en Uebels entdeckte; die Ansteckung gab sich an dem Kinde
cht eher als 9 Jahre hernach zu erkennen und ver-
th sich zuerst durch den Kopfgrind (tinea); der *spiritus*
ercurialis der vier Monate lang gebraucht wurde, schien
gesund zu machen, das Jahr darauf kam der Aus-
lag wieder, aber gelinder. Es erfolgten aber fressende
eschwüre im Halse, sie fing an durch die Nase zu reden
d war oft heiser (2)." — „Zwei Geschwistern wur-
n von ihrer Amme angesteckt, welche die Nase verlor,
s sie den Dienst der Eltern verließ. Das venerische
ift brach nicht eher an diesen aus, als bis sie ungefähr
) Jahre alt wurden (!) (3)." Idem auctor observatio-
n citat a Goulard (4) publici juris factam: Mulier quae-
n tota in corporis superficie ulcera pustulasque exhibebat,
aque maritus illius, hoc tempore perfecte sanus et robustus,
fessus esset, se ante 15 annos ulcus syphiliticum tumo-

(1) Kinderkrankheiten, übersetzt von Murray, ed V. 1785,
. 27. p. 684.
(2) Rosenstein libr. cit. pag. 698.
(3) ibidem.
(4) Oeuvres de Chirurgie T. II. pag. 19.

remque inguinis habuisse, Goulard ex eo conclusit, mul ris eruptionem pustulosam veneream esse. „Der Ausga „bestätigte sein Urtheil, denn so wie man die Kur mit d „Merkurialsalbe fortsetzte, minderten sich auch die Zufä „und verschwanden zuletzt ganz." Tum Goulard et n rito proposuit eidem sese subjicere curae, ne mulier den infectionis periculum subiret; consilio vero hoc non accep uxor iterum infecta est, virusque in pectus transsiliens vita miserae eripuit. „Den Mann konnte man deswegen de „noch zu keiner Kur bewegen, weil seiner Gesundheit so „nichts fehlte, so wie er auch noch über 25 Jahre na „dem Tode seiner Frau in diesem Zustande lebte." — H ergo virus 40 annos in mariti corpore latuit, uxorem sustul in illo minime se manifestans! Hanc vero alias esse inf ctam — quae conjectura in oculos incurrit maximeque pr babilis est — neque Goulard suspicari videtur, neque R senstein, qui contra illam observationem ita commentatu „Es ist besonders, daß sich diese Krankheit bei vielen ve „borgen hält, und zwar bisweilen einige Jahre lang, „man gleich völlig überzeugt (?) ist, daß das Gift im Kö per liege und andere davon angesteckt worden sind" (1). — S judicaverunt clarissimi medici, sic opiniones praejudicatae etia ingenia erroribus implicant! — Discat ex his exemplis Le tor Candidus, quam pauca facta demonstrata, observatione que quam paucas luculentas ars nostra nobis offerat, quan que vacillantia sint permulta eheu! in medicina praecepta!. Rosenstein praeterea nonnullos affert casus admodum m rificos ut exemplum, quo epilepsia, post amputationem bra chii in milite exorta, nonnisi frictionibus mercurialibus sa nari potuerat, quia aegrotus diu antea malo laborasset vene reo neglecto. Simili modo vir quidam quinquagenarius, jam sextum per annum atrophia et debilitate correptus, quas ne que Stahl neque Hoffmann auferre potuerant, Montispel denique, ubi facultatis medicae professores causam suspica bantur syphiliticam, per frictiones mercuriales, *cum cur lactea* junctas, sanatus est, aeger quamquam sancte affirma bat, neque se ipsum, neque parentes vel nutricem, affection

---

(1) Conf. Rosenstein libr. cit. p. 699.

ibet syphilitica unquam laborasse (1)! Noli inquirere Le- Candide, utrum frictiones mercuriales, an cura lactea ae- um illum sanaverint. . . . . —

Ubinam autem quaerenda est hujusce *syphilidomaniae*, icos saeculi proxime elapsi cruciantis, causa? ubi causa plicationis venereae ubicunque praejudicatae? Nulla, credo, in re, quam in morum increbidilem in modum aucta uptione, quae saeculo XVII. et XVIII. ex Gallia, velut ro, totam inundaverat Europam. Quis non perhorrescit ginem in commentariis historicis illorum temporum nobis tam — ubi omnes inter societatis classes, summa regna- effrenataque licentia, ubi vincula jugalia ludibrio ha- ntur, juventus ubi ab incunnabilis corrumpebatur, ubi lissimis in coetibus, imo matronarum in praesentia, dis- batur de affectione syphilitica (»d'une maladie ga- «) sicuti nostra aetate vix de tussi vel coyza sermo ubi, si narrationi Grimm, Germani Parisiis degentis, est habenda, coetus inveniebantur, in quibus omnes con- e viri aeque ae foeminae, nudi penitus apparebant; hisce entibus libidinosissimis (»bals à l'anglaise«) summi in blica principes interfuerunt. Legas, Lector Candide, quae échal de Richélieu, quae Hamilton, quae Casa- a de Seingalt nobis narrant et non amplius miraberis, medici illis temporibus plurimis in morbis vel luem lar- m, vel complicationem syphiliticam suspicati sint! Illo ulo, quo maritus quidam nobilissimus, sic legimus apud nilton, data opera se infici curavit et hoc modo uxorem perfidam inter coitum, et ejus ope amatorem foeminae cendi causa infecit; ubi matrona viro triumphans litteris ntiat, se urethritide illum donasse ad vindictam exi- am; ubi poëta octogenarius opus »la pucelle d'Orléans« cribere et publice in coetu numeroso virorum et matro- m recitare potuerat; ubi syphilidis curatio pharmacopolis mforaneis et arcanorum venditoribus commissa erat, mer- que sublimati denique recenti iterum commendatione sa- nes ubi citius, sed non magis radicitus perficiebantur; — dico temporibus excusandi erant medici, quod ubicunque

(1) Conf. Boissier de Sauvages Nosologie méthodique, II, p. 2 a, pag. 383. — Rosenstein, libr. cit. pag. 703.

luem videbant veneream quodque Rosenstein, ut supra moravimus, 26 morbos enumerat, quorum syphilis for induere possit.

Tunc Lectori sat cogniti exorti sunt in Gallia eve publici, cruentis litteris historiae paginis inusti aeneis! Ord nobiliores patrimonio divitiisque amissis, vel caput se submittere, vel in triste exilium migrare coacti sunt, bell que internecivum omnibus privilegiis et praerogativis, a jure traditorio derivatis, illatum est. Et medicos vertigo l corripuit revolutionaris, cujus jam fundamenta Hunter opere suo (1) jecerat, id quod scripta philosophorum Ga rum *Encyclopaediae* auctorum fecerunt respectu rerum p ticarum: Mecurius quasi absolutum et specificum remed antisyphiliticum regno expelli, ipsa syphilis privilegio spe citatis spoliari, principiumque aequabilitatis perfectae in nes quidem morbos deferri debebat! Jam a. 1792 Pu chirurgum militarem Gallum, mercurium rejicientem vidin affectiones syphiliticas primarias simplici methodo curant a. 1796 Gallée inspector sanitatis exercituum Gallorum valetudinario Brestiano omnes syphiliticos sine merci sanat; a. 1799 Clutterburck idem in Britannia susci 1800 Kéraudren curam syphilidis simplicem adoptat; 1803 Sarleson mercurio in lue sananda tartarum stil tum refracta dosi (l'émétique en lavage) substituit cum s cessu; eodem tempore Thomson, Anglus, affectiones ve reas secundarias sine mercurio sanari posse, adfirmat. F guson, medicus castrensis Anglus, a. 1804 in Lusitania servat phaenomena syphilitica illis in regionibus non sol mercurio resistere, sed ejus post usum demum affectio apparere secundarias, quae e contrario in nosocomiis ab i per biennium gubernatis, mercurio omnino rejecto, ex t incognitae erant, quod alii medici et in Hispania confirma Ab anno inde 1808 usque ad 1813 curatio antimercuria et in Bavariam, Americam septentrionalem et in Britanni — Rose, Guthrie, Hennen, Carmichael, S. Coop multisque aliis operam dantibus — increbruit. (2)

(1) A treatise on the venereal disease by John Hunt London 1786. 4o.

(2) Amplius de hac re tractatum invenies in Desruell op. citato p. 96—109.

Anno 1815 Broussais, ille Napoléon medicorum, qui minus fere sauguinis per hirudines, quam magnus hic ator per arma et exercitus effuderat — hasce promul- *propositiones*, quae, etiamsi non omnino probandae, minus ingenii acumen beatissimamque ubertatem prae- hujus demonstrant medicinae reformatoris: »Syphilidem ussais morbum esse dicit, cujus ad sanationem, quamdiu lis sit, antiphlogistica localia et praecipue numerosae suf- nt ***hirudines***; qui autem, si inveteraverit, nonnisi anti- gosi cedat strenuiori abstinentiaeque, quibus tamen, ut e aegrotos debilitantibus, lubentius medici mercurium et rifica praeferant, remedia per revulsionem in vasa capil- depuratoria (capillaires dépurateurs) efficaciam exseren- haec vero non sat caute adhibita facile ***gastroenteriti-*** provocare vicissim in affectiones syphiliticas externas ites easque evehentes, vel etiam viscera adficientes fran- esque. Excitantia topice adplicata ad mala syphilitica riora plerumque ea reddere et tantum si levis sit irri- , stimulo novo priorem removeri. Esse ***Praedisposi- em ad syphilidem*** (aeque ac sit ad scrofulosin), ***qua editos homines multo difficilius curari, quam ros.«*** — Hanc ultimam Broussaci opinionem typis is scripsi, mihi enim maximi momenti in ferenda sen- de veneno syphilitico esse videtur, nec non ad multas andas difficultates, quas syphilidis indolis specificae unt adversarii.

Anno 1822 Methodus Simplex in Sueciam introducta t Wilhelm eam in valetudinario adhibuit Mona- i (1), quum jam a. 1816 Brünninghausen primum rmania eam expertus esset. A. 1825 Fricke curam logisticam in nosocomio communi Hamburgensi (allge- s Krankenhaus) administravit et mox ardentissimus defensor mercuriique adversarius factus est. (2) Me- simplex denique inde ab anno 1831 a C. Kluge, ptore meo summe venerando, in Nosocomio Caritatis iensi sola adhibetur, mercurio plane rejecto. Quo duce it mihi per 6 menses in centenis utriusque sexus aegris,

---

) Desruelles l. c.

) Vid. Annalen der chirurgischen Abtheilung des allgemei- rankenhauses zu Hamburg, v. Fricke. Hamburg 1828. B. I.

in statione sic dicta syphilitica (vulgo der Pavillon), syphil
observare, complexumque eorum, quae ex tirocinio meo
dici, sequentibus in pagellis ingenue, et quantum mihi
suadere potui, exponere conabor.

(Quod ad numerum aegrorum a die inde 1ma m.
tobris a. 1837 usque ad diem 31 m. Martii a. 1838 in
tionem syphiliticam receptorum, vir illustrissimus Kluge su
cum benevolentia haecce mecum communicavit:

Die 1ma m. Octobris remanserunt in statione ex trimestri antecedente	38 vir.	56 mul.
Recepti sunt novi aegroti ad diem 31. m. Decembris: ex urbe	129 -	116 -
ex aliis station. nosoc. Caritatis	9 -	28 -
	176 -	200 -
A die 1ma m. Januarii a. 1838 usque ad d. 31. m. Martii recepti sunt: ex urbe	109 -	123 -
Ex aliis stationibus nos. Carit.	24 -	36 -
peregrinorum	1 -	2 -
	134 -	161 -
Summa totalis:	310 vir.	361 mul. = 671

Aegros adire Kluge mihi non solum permisit di
studiosorum medicinae institutioni dicatis, sed etiam bis
terca per hebdomadem una cum medico stationi praef
quam propter benevolentiam erga me publice illi ex imo
ctore summas ago gratias.)

II. DE DIFFICULTATE ACCURATIORFS CIRCA SYPH DEM OBSERVATIONES INSTITUENDI.

Inter omnes morbos syphilidem illum esse, in quo
tior penitiorque indagatio dificillima sit, jure contendi
mihi videtur. Quum nempe in praxi quotidiana aegri lu
tes omnia data aetiologica, quae dijudicanti medico ali

possunt momenti, exponant, statumque et naturam mali
ne celent, contrarium ex toto in syphilide laborantibus
us: omnia hic, praecipue a sexu sequiore, tentantur ad
um eludendum, momenta occasionalia vel omnino dissi-
tur, vel imponuntur illi falsa, ita ut in praxi privata
ue nobilioribus et aegrotorum relationes falsae, et dif-
s, maxime in mulieribus, locum inspiciendi affectum,
gnosis denique morborum venereorum haud expedita —
haec concurrant, ad delectum curationis therapeuticae
impediendam. Si foemina fluore albo adfecta sancte
at, se malum suum ex aqua e cyatho sociae (cujus pro
n integritate sane spondere nequit) hausta contraxisse,
e indicium ad explicandam mali naturam syphiliticam
re autumat, vel amiculo ejus induto, vel similes affert
s, tum medico nulla alia superest via, quam aut re-
necessaria seponendi contraque morbum ipsum nihil
iendi, aut contra saepius decepto eoque modo pruden-
facto, multis in casibus, ubi nulla revera locum habue-
nfectio venerea curam instituendi antisyphiliticam, quae
certa non adest indicatio necessitasque, nonnisi nocere
t; idque de mercurio praecipue dici debere, inficias ire
us. Saepe aegroti, maxime mulieres, se infectas esse
no ignorant, infectione a marito libidinoso communicata;
usque ad foeminam, statum suum non suspicantem, ac-
ur non prius, quam malum progressum extensumque
et ne tum quidem diagnosis semper expedita est, quum
us plerumque culpam suam non confiteatur. Neque
s etiam aegroti confessio semper magni est ponderis: si
nos vir, balanitide vel ulcere glandis post coitum ad-
, certine sumus, mala haec syphilitica esse? Vel puella
ublica, quae ex nosocomio Caritatis in integrum resti-
dimissa, tertio jam die rediit, postquam brevi hoc tem-
spatio *tricies ter* sese prostituerat, num excoriationes
us vagina vel ulcerationes venereae, an tantum ex nimia
ranae pudendi mucosae irritatione exortae erant? —
c semper ubi occasio nobis data est, puellam, quae vi-
infecerat, explorandi, haec indagatio docere nos potest,
n num infecti malignum an benignum sit, etiamsi Hun-
contendit, unum tantum certum existere signum, ex quo
rem syphiliticam esse, concludere possimus „die Versi-

„cherung einer zuverlässigen Mannsperson nämlich, da „von derselben angesteckt worden ist" (!) (1). Nam v syphiliticum cum puella coire, illamque postea cum alio tore infectionem communicare posse, nullo tamen in ge libus foeminae phaenomeno suspecto vel minutissima inc tione detegendo, una cum **Kluge**, **Desruelles** (2) et quidem **Hunter** (3) credo. Materiam enim contagiosar vagina inter coitum deponi et alium ad infectionem opp num postea inficere posse, puella nequaquam adfecta, ma est verisimile.

Adde hisce omnibus difficultatibus et illam, quod *culum uteri*, quo ad explorationem partium genitalium liebrium minime possumus carere, certum si velimus de nitate foeminae judicium ferre — in praxi privata rarius hibere licet, quum etiam in nosocomiis scorta, introduct corporum alienorum in vaginam adsueta, usum illius non maxime invita patiantur (4). —

Sed alia sunt momenta, quae sicut singulis in casibus dia sin difficiliorem reddunt, ita quominus summa observatio theoretice eliciatur impediunt, illaque maxime in falsis ae torum relationibus posita sunt, quae omnino saepissime in rores nos inducunt: haud lubens quisquam excessus con tur, qui bonam ejus famam et relationes públicas in dis men vocare possunt; ita ut perpaucae tantum auctorum c morbos venereos observationes severiorem sustineant pers tationen. Sic exempli gratia, in amplo quodam nosoco syphiliticorum juvenis nobis ostenditur, condylomatibus minatis in utroque scroti latere femorumque parte inte adfectus, qui coitum se exercuisse omnino negat mal que socio, sine dubio infecto, imputat, eundem secum le lum occupanti. Hunc casum medicus valetudinario praep tus nobis velut argumentum infectionis venereae absque concubitu offert et pro tali ad diarium refert. Explorati vero repetita partium genitalium aegroti, in praeputio, nulo et corona glandis parvula invenimus condylomata a

(1) Conf. **Richter** *chirurgische Bibliothek*, B. IX. p. 22
(2) Libr. citat.
(3) **Richter**, chir. Bibliothek l. c.
(4) Conf. **Most** Encyclopädie etc. ed. 2a, B. I. p. 56.

ta, quibus conspectis statim omnibus perspicuum reddi- juvenem illum nobis imposuisse quod postea etiam con- r. — Tales conclusiones temerarias vel cautissimus me- haud raro colligit, quare maxime circumspecte legendae omnes observationes in scriptis quotidie velut decretoriae ci juris factae; nam et illud, quod statim apposuimus, plum non penitus rem demonstrat. Nonne potuit aeger r, condylomata revera ex concubitu cum socio syphilitico ahere? Nonne praedispositione ad vegetationes anoma- u cute evidenter existente, illae potuerunt aeque se in utio et glande, ac in scroto evolvere? Nam ponamus il- et coitum cum scorto exercuisse, syphiliticum ne hoc e, certum est? Nonne irritatio vel tantum excitatio su- iei glandis potuit quasi momentum agere occasionale ad ylomata jam alias luxuriantia, et ibi producenda?

Quoties de voragine cogito, ad quam similis recensio rior singularium observationum nos adducat, anxium me confiteor; tum nempe omnis cessaret circa syphilidem rientia, praecipue quod ad methodum curandi; quolibet modo sanata affectio syphilitica ancipitem admittit ob- onem: reverane malum illud venereum fuerit — aliaque scunque curatio vel et nulla quidem nonne eundem ha- ra fuerit successum?

Quaestio de ***recidivis*** similem nobis offert difficulta- quas nempe post methodum antimercurialem frequentio- esse multi contendunt. Sed de hac re certas colligere rvationes haud expeditum est; in nosocomio Caritatis linensi, ubi solae puellae publicae, quasi *ex officio* se- et longiori subjiciuntur observationi, nequaquam plu- ori in casibus dici potest, novane infectione scortum paulo s dimissum, ad stationem redierit, an morbus prior a livus sit? Viri rarius breve post tempus revertuntur, si hoc fieret, quis aegro novam infectionem deneganti let, ejusque indicia pro certo habebit argumento? — re nescio, quomodo praeceptor meus summe veneran- Jüngken, quem persaepe affirmantem audivi, »reci- vas affectionum venerearum eo ex tempore praecipue rolini frequentissimas factas esse, quo methodus simplex nosocomio administrata sit Caritatis« — opinionem suam nonstrarit. Eandem objectionem et praeceptori meo ex-

perientissimo Trüstedt opponi posse, quis negabit? nempe, adversarius curae antiphlogisticae, in praejudiciu lius narrat, »multos aegrotos, praecipue nautas, quos Fri »Hamburgi sine mercurio curaverat, paulo post ad nosocon »Magdeburgicum (urbs haec ad Albin fluvium sita, cr »commercio cum Hamburgo utitur) cum recidivis venisse sed unde hic certum firmumque documentum petendum aegros in itinere vel alias, non iterum se exposuisse ctioni? — Tunc tantum recidivam suspicari possumus, in homine antea ***plane sano***, brevissimo temporis sp symptomata extensionem ***stadiumque*** attigerunt talia, lia phaenomena ***primaria*** nonnisi post longam diuturn tem offerre solent; sed ne hoc quidem signum sen certum.

Novum praeterea medico quod ad diagnosin oritur pedimentum, confusionem adhuc augens, ex eo, quod h raro ulcera syphilitica genuina in genitalibus inveniuntur, men longo ex tempore coitu non commisso: ulcera sypl tica scilicet ***consecutiva***, ad quae praecipue clarissi Rust, praeceptor meus, attentionem nostram direxit. N in aegris lue sic dicta universali laborantibus, laesiones cu traumaticae, excoriationes insontes in ulcera interdum mut tur venerea, vel haec et sponte nascuntur, quod equid ipse vidi: ulcera haec sicut in qualibet cutis parte, ita et genitalibus erumpere posse, neminem fugit; quomodo v medicus distinguet hic, qualem affectionem ante oculos l beat, aegroto affirmante, plures se jam menses nulla cu foemina commercium habuisse (1)? Medicus non semper s tim dyscrasiam totum corpus corripientem perspiciet, n semper in genitalibus cicatrices priorum ulcerum inveni quae prorsus existant haud necesse est; potest enim qu quam infici nullo antecedente coitu, vel per contagium s

---

(1) Liceat mihi tamen in parenthesi hic addere, laesiones c tis syphilide correptorum, minime omnibus in casibus in ulcus m tari venereum, sicut multi credunt: saepissime vidi, vulnus po phimoseos operationem vel totalem circumcisionem, in aegris co dylomatibus vel ulceribus glandis et praeputii adfectis, paucis di bus per primam intentionem reuniri, idque plurimis in casibus qu mihi observare contigit, locum habuit.

iticum vulneri cutis insitum, vel membranae mucosae oris licatum etc. Ita Kluge casum vidit, ubi nonnulli texto- una in officina laborantes, ulcera contraxerunt faucium condylomata pharyngis, quia communi utebantur tubulo telam textoriam conspergendam (Pustrohr), idque adhi- atur et a socio illorum talibus malis in ore adfecto. Si- modo et inter partum haud raro vel parturiens ab ob- rice, vel haec a parturiente inficitur (1); — quaenam via iedico tali in casu eligenda? quomodo exempli gratia, inda est foemina ab obstetrice infecta, postea ulceribus ium correpta, dum plerumque medico nullam mali causam rre potest? — (2)

Ad quam quaestionem difficillimam non antea respon- licebit, quam aliam absolverimus: ***Certamne habea- s omnino singularium formarum syphiliticarum gnosin?***

Permultos hanc medicos negaturos esse, haud ignoro;

---

(1) Conf. J. Wendt die Lustseuche in allen ihren Richtun- und allen ihren Gestalten etc. Breslau 1825, ed. 3a, §. 9.

(2) Dr. Sick narrat, obstetricem inter partum foeminae sy- iticae ita se per digitum laesum infecisse, ut non tantum ul- omnino venerei criteria exhibuerit, sed mox ipsa ulceribus sy- iticis labii inferioris, palati duri et mollis et carie ossium nasi, nthemate syphilitico et rhagadibus correpta fuerit; nihilominus italia miserae erant „frei von jeder blennorrhoischen und ulcerösen chaffenheit, auch waren nicht die geringsten Narben eines dagewesenen Ge- würes vorhanden." Infectio obstetricis locum habuit die 4o. m. i a. 1830, exploratio illius medica die 1o. m. Martii a. 1831; temporis spatio illa adhuc 7 tam puerperas quam neonatos cerat, quorum aliae ulcera genitalium, aliae exanthemata tantum hilitica, aliae denique nonnisi ulcera faucium sine ulla pudendi ctione exhibuerunt. (conf. Medic. Zeitung herausgegeben vom eine für Heilkunde in Preufsen; Berlin 1837, No. 13.). Most ervationem evulgat in opere suo (Encyclopädie der gesammten dic. und chirurg. Praxis etc. 1836; ed 2a; T. I. pag. 460.), medicus digito indice vulnerato versionem in parturiente su- cta („verdächtige Kreißende") perficiens, 14 post dies inter motus riles toto in corpore exanthemate syphilitico, condylomatibus s circa anum et ulceribus venereis in faucibus correptus, non cura severiore plures per hebdomades adhibita (pilul. ex hy- rgyro muriatico corros. Dzondi, decoct. rad. sarsaparillae, diaet. c.) sanatus fuerit: ulcus in digito omnes characteres obtulit hilitici aeque ac cicatrix ejus.

imo tali diagnoseos, secundum opinionem suam, incertitud
utuntur ad mercurii usum plane rejiciendum — hoc re
dium periculosissimum praetexentes, saepe in affectionibus
nignis atque omnino non syphiliticis ab hydrargyroph
adhiberi; quum contra methodi antiphlogisticae advers
contendant, plurimos sine mercurio sanatos syphiliticos
fuisse. Sic Fricke se, granulo mercurii sublimati corros
inter glandem penis et praeputium applicato, post 24 —
horas ulcera produxisse affirmat a syphiliticis Hunteria
sic dictis, minime distinguenda. Eadem et Desruelles (
se post ustionem ope boleti igniarii observasse narrat,
post introductionem globuli e linteo carpto inter gland
et praeputium, vel denique ope causticorum, cantharidum e
producta. Equidem ulcera observavi per totum eorum
cursum, in nosocomio Caritatis Berolinensi experimenti cau
in superficie interna labii majoris puellae non syphilitica
inque praeputio et glande nonnullorum virorum, ope hydra
gyri muriatici corrosivi producta, quae *minime* pro vener
haberi potuerunt; plura de hac re leges, ubi de ulcerib
sermo erit, ibique indicabimus signum diagnosticum
Kluge primum observatum, quod uno in casu egomet conf
matum vidi.

Quantum igitur me tot aegrorum syphiliticorum obs
vatio docuit, non possum cum Kluge non affirmare: ***Om
nes formas syphiliticas primarias in genere, sua h
bere signa characteristica, pathognomonica, permu
tis in casibus certam permittentibus diagnosin,*** etiam
infitias non eam, quin interdum casus occurrant, ubi diffic
limum sit statuere malumne syphiliticum sit,[1] nec ne? —
Quumque aegroti relatio, mea opinione, perpauca valeat, t
lis si usus veniat semper suaserim, non temere mercuriu
administrare, sed potius antea curam adhibere simpliciore
quamquam grana decem bichloreti hydrargyri methodice, cu
que necessariis cantelis porrecta, vix unquam aliquam affer
possunt noxam; imo de Gräfe, praeceptor meus benevole
tissimus, se ad *triginta* usque illius praeparati grana sensi
administrasse, saepissime quidem optimo cum successu, aff

(1) l. c. p. 137.

. — Sequuntur adhuc generalia quaedam ad diagnosin ctionum syphiliticarum pertinentia; penitiora vero in capi-s singulis formis dicatis exposita leges. —

I. DE COLORIBUS IN SYPHILIDE, UTI MOMENTO DIAGNOSTICO, DEQUE PARTIUM GENITALIUM EXPLORATIONE.

Primum, quod in oculos incurrit phaenomenon affectio-n venerearum — ***color*** est, quem marginem ulcerum oc-antem videmus, superficiem membranarum mucosarum in anitide, elytritide etc., cutem glandulas inguinum inflam-tas obtegentem, quique omnium vegetationum denique ma-ne proprius est. Color hic ***cupreo-ruber***, ad nullam m phlogosin pertinens, multis in casibus tam manifeste ressus est, ut primo statim intuitu medicus expertus sta-re possit, cujus sit naturae inflammatio; quare hoc sym-ma, cujus ne mentionem quidem in Desruelles tra-tu invenimus, minime parvi faciendum est, quum etiam i adhuc morbi constantes nobis offerant colorum mutatio-s: cui ignotus est color rubro-flavescens erysipelatis exan-matici; rubor inaequalis, passim intensior fusciorque pseu-erysipelatis Rustii, rubor violaceus inflammationum ulce-uque venosarum sic dictarum; fuscescens, quo partes mol-. ulceri ossium carioso vicinae induuntur; color cinnabarino-ber, quem inflammationes, ulcera et cicatrices scrofulosae membranis relinquunt mucosis, quod in conjunctiva palpe-arum et maxime in vagina perspicuum est; color denique e stramineo-flavus, quem aegroti, carcinomate ex diathesi niversali laborantes, exhibent. Maxime indagatione digna set causa harum omnium coloris differentiarum, quae etiam dijudicandis oculorum morbis summi sunt momenti, uti ingken, clarissimus ille naturae observator, egregie docet; uum tamen omnibus adhuc datis hanc circa causam carea-us, factorum expositione contenti esse debemus. Itaque olor cupreo-ruber comes est characteristicus affectionum sy-

philiticarum, et quidem circumscriptus semper ille adpa ubicunque, in centro aeque ac marginibus, aequabiliter int sus; invenimus eum in urethritide venerea ad orificium u thrae, in balanitide et posthitide ad superficiem glandis praeputii; adenitides syphiliticae inguinum, tumorum cupr rubrorum speciem exhibent; contra bubones rheumatici Wendt (1) *catarrhales* dicti), scrofulosi et consensual vel sine ulla cutis mutatione coloris sese offerunt, vel pri maxime coloris sunt laete rubri marginibusque diluti. Ipsae q dem oculi tunicae conjunctiva et sclerotica, syphilitica adfect inflammatione, colorem cupreo-rubrum exhibent.

Quapropter una cum Kluge, Rust et aliis, colore hunc signum ***pathognomonicum*** in syphilide esse cense cujus praesentia semper diagnosin certiorem reddit, absent vero neque pro neque contra pugnat; quum enim coloru transitus et variae illorum mutationes tam gradatim et inse sibili fere modo fiant, ut minime certum possimus finem te minumque inter momentum statuere, ubi rubor cupreus es desinat et violaceus, vel roseus fieri incipiat — non semp etiam aeque facile est, definire, cujus generis ille sit, que ante oculos habeamus. Eodem modo aliorum colorum ad mixtio genuinum mutare, vel ex toto diluere potest; sic loc cinnabarino-rubra, quorum supra mentionem fecimus, quaequ Berolini, ubi scrofulosis inter homines ordinum inferioru creberrima est, plurimorum in vagina scortorum inveniun tur, facile ruborem cupreum ulceris syphilitici, talem fort locum occupantis, obscurant. Idem accidere potest in ***gra vidis***, quarum membrana vaginalis mucosa, sicut Kluge pr mus docuit, notabilem exhibet colorem ***violaceum***, quod equi dem ipse saepe vidi; secundum Parent-Duchatelet (2 Jacquemin Parisiis eandem fecit observationem, qui nemp vaginae colorem in gravidis, coloris »violacée ou lie-de-vin« esse affirmat.

---

(1) libr. cit. §. 101.

(2) Sur la prostitution dans la ville de Paris. 1837. cap. III §. V. — Jacquemin contendit se ex uno hoc signo, aliis omnibus deficientibus, dicere posse an gravida sit puella, nec ne? — Quantum ego vero observari, frequentes inveniuntur exceptiones et facile errabit medicus, qui soli huic colori diagnosin superstruet.

Secundum phaenomenon haud minus characteristicum ɪtatio coloris cupreo-rubri in *fuscum* est, ubi ad sanati-ɪm jam prope accedit affectio syphilitica; eumque in ure-ide orificium urethrae occupantem observamus, marginem ɪdumque ulcerum, nec non bubonum ulceratorum; omnium- : condylomatum, praecipue latorum, superficiem; praesentia s, secundum Kluge, certum est signum diatheseos syphili-.e in organismo penitus destructae, ulcere etiam ac blen-rrhoea nondum ex toto sanatis. Sunt tamen aliae affectio-, ut psoriasis diffusa et maxime guttata, quae plurimis in ibus, sanatae maculas fuscas in cute relinquunt. —

Hisce expositis ad *explorationem partium genita-m* in aegris syphiliticis transeamus, quae nequaquam expe-a est, nunquam sat exacte institui potest, inque praxi pri-a permultas offert difficultates.

Pudendum virile magis extus situm, minorque hujusce ɪus verecundia rem aliquatenus expeditiorem reddunt, sem- tamen satius erit, aegroto, ut braccas infra genua demit- imperare, quum saepe quisquam urethritidem offere possit, ɪus diagnosis obscura statim certa evadit, condylomatibus crena ani etc. inventis, quam partem non semper sponte lorandam praebebit aeger. Vix credibile est, quantam ae-ti similibus in casibus medicum decipere operam dent, ɪmque auxilium nostrum contra mala sua querant, nihilo-ɪus causas illorum statumque verum celent. Sic nuper vir dam ad policlinicum de Gräfe venit, in inguine sinistro ɪorem exhibens, per saltum, uti dixit, exortum, ita ut primo mento herniam ante oculos habere crederemus; quum tamen ɪor cupreus circumscriptusque tumoris, et praecipue timidi-, qua aeger braccarum fibulas laxaverat, attentionem no-ɪm unice ad regionem advertens inguinalem, suspecti nobis erentur, aegrotus praeputium penis retrahere jussus est, ɔ facto extensum in corona glandis invenimus ulcus syphi-cum, herniaque illa in bubonem statim mutata est vene-m! — Simili modo memini, medicum juvenem in exan-matum cognitione valde versatum, in clinico medico-chirur-o Trüstedt militem nobis ostendisse, efflorescentia pa-osa in inguinibus et regione hypogastrica adfectum; quod dem malum a medico domi privatim exploratum pro *ythemate papuloso* (Biett) habitum est; nobis vero di-

agnosis haec non aeque certa visa est, quare praeceptore r
tro Trüstedt praesente, aegrum manus a genitalibus, q
prae verecundia quasi tegebat, amovere jussimus — tum
tum scrotum, internam femorum partem crenamque ani, p
cherrimis, quae unquam mihi videre contigit, condylomati
latis obsita invenimus!... Quapropter medicus nunquam
gligere debet, penis glandem ipse manibus prehendere et
regionem praecipue frenuli inquirere, cujus plicis haud ra
parvula celantur ulcera, vel condylomata; neque anus om
tendus est. Illaesis digitis nunquam infectio immediata
menda, Fricke quidem et vulneratis illis hoc rarissi
fieri (1) affirmat. Nihilominus post unamquamque explo
tionem manus bene lavare prudentis erit medici, ne pus
mucus contagiosus forte nasi vel oculi membranis muco
applicetur, neve alii inficiantur aegroti adhuc examinan
quod maxime in nosocomiis, ubi multi illorum unus post
terum explorantur, fieri debet. Artificium denique memora
dum est, saepe in valetudinariis ab aegrotis urethritide lab
rantibus adhibitum, qui scilicet domum redire cupientes, p
rumque brevi ante medici inspectionem mingere solent et
omnem in urethra collectum abluunt mucum, ita ut ne pr
sione quidem penis aliquid ex urethrae orificio prodeat; s
tum urinae guttulae in eo haerentes, vel ex illa adhuc st
lantes, mox dolum detegent. —

Multo difficilior exploratio est ***naturalium muliebriu***
ubi praeter dispositionem partium anatomicam, verecund
(in praxi privata) quae tali indagatione maxime offenditu
et necessitas impedimentum offert, adjutorem semper adhibe
di, si accurate pudendum inspicere velimus. Medicus vero c
modestia et boni mores, aegrotantium conciliaverunt fiducia
etiamsi adhuc juvenis, assensum semper obtinebit. Administ
obstetrice utatur necesse est; hujusce autem solius expl
rationi et verbis nemo medicorum — quamquam haud ra
hoc fiat, confidere debet.

Aegra ita e regione fenestrae ad marginem mensae v
lectuli alti jaceat, ut pelvis plane libera sit, femoraque d
varicata et flexa sellulis innitantur; sic nempe aditus ad con

(1) Annalen des allgemeinen Krankenhauses etc. B. I.

suram vulvae posteriorem et ad vaginae parietem inferio- commodior est. Ubi prostat, ex. gratia in nosocomiis, eferenda est *sella exploratoria* ad illius instar, quae in ione syphilitica nosocomii Caritatis adhibetur: e mensa stat alta, aeque lata ac longa, ad quam per aliquot gra- adscenditur; hisce obversus margo incisuram exhibet el- cam ad pelvin excipiendam, margo vero oppositus admi- ıum mobile, pulvinari tectum, ad caput humerosque aeg- e sustentandos offert. — Antequam ipsius vaginae inci- ur exploratio, regionem exquiras inguinalem, ubi haud bubones inveniuntur incipientes praetermittuntunque, nontem veneris, saepe pediculos pubis, etiam puellis in antioribus, exhibentem (1), denique adspicias nullane con- mata vel ulcera flexura celentur femorum. Multas apud ieres cutis hujus regionis fusci est coloris et quidem in- ior in ipsa flexura, dilutior in marginibus; secundum ge hoc signum est status haemorrhoidalis. — Ad vul- inspiciendam adjutrix labium majus sui lateris ita digi- extensis detrahat, ut brachium suum internae aegrotantis oris parti applicet cubitoque genu illius retrudat; idem in ro latere faciat medicus; tunc introitus se offeret vagi- ad cavitatis instar infudibiliformis, oblique retrorsum endentis, puellis junioribus propter canalis angustiam in mitate sua vel ex toto clausae, vel parva tantum aper- munitae; parietes hujusce cavitatis in foeminis sanis, eque nondum coitum crebro exercuerunt, pallido-rosei sunt ris et pauco tantum muco obtecti; mulieres vero aetatis ectioris membranam exhibent mucosam coloris magis fus- entis laxamque, vel interdum ex toto prolapsam. Bero- saepe etiam in scortis junioribus parietem vaginae supe- em vel inferiorem, vel ambos quidem, demissos prolapsos- vidi; labiis pudendi retractis, tumores exhibebantsphae- s, vel pyriformes, mutuo se tagentes introitumque vagi- claudentes; repositio vero illorum perfacilis est. Kluge ae superiori nobis narravit, cel. R. Froriep nuper secti- us cadaverum cognovisse, hasce vaginae prolapsus veras

(1) Parisiis vero rarissime illos apud scorta inveniri Parent- hatelet (libr. cit.) affirmat.

esse ***hernias***, intus sacco peritonaeali munitas ansamque in
tini continentes; si ulterioribus indagationibus observatio h
confirmabitur, operatio a Dupuytren, et postea a praec
tore meo celeberrimo Dieffenbach, ad sanandos uteri et
ginae prolapsus inventa, nonnisi caute erit instituenda; n
in excisionae angustaram ex parietibus vaginae, secundum l
viros ingeniosissimos, laciniarum cavendum erit, ne sac
peritonaei, vel ipsum quidem intestinum incidatur. —

Praeterea attentione digna sunt orificia ***folliculor***
mucosorum quae haud raro $\frac{1}{2}$ ‴ per diametrum patent
vel ***rotunda*** sunt, ita quidem, ut fundus folliculi orifici
magnitudine superet, vel ***bursiformia***, magnam cum ve
rum valvulis similitudinem offerentia; orificia haec non om
apud foeminas inveniuntur, neque illa unquam numerosa vi
unum vel duo plerumque in uno vel ambobus introitus va
nee parietibus, vel ad internam labiorum pudendi superfici
egomet inveni. Hisce folliculis saepe, ut Fricke (libr. ci
primus demonstravit, mihique ipso bis vel ter observare co
tigit, ulcera absconduntur vel condylomata, quae nonnisi o
ficio illorum ope specilli explorato perspicua fiunt, quare ha
cantio nunquam est negligenda. — Membrana mucosa deniq
vaginae multis in mulieribus ***processus*** varii voluminis e
hibet, vel basi latae insidentes, vel cylindricos, quorum un
semel ad $\frac{3}{4}$ ″ longum vidi; nonnulli interdum introitus p
rietes ita occupant, ut hunc fere obstruant; confundendi t
men non sunt cum carunculis sic dictis myrtiformibus qu
nequaquam omnes apud puellas inveniuntur, (quare mihi o
nio illorum, qui carunculas hasce pro hymenis reliquiis h
bent, cum Velpeau (1) aliisque verisimilis non videtur) -
verae enim sunt membranae mucosae appendices congenit
quae in exploratione naturalium interdum condylomatum sp
ciem mentiuntur; superficies vero appendicum laevis et me
branae mucosae ambienti omnino similis facile diagnosin eru
quum superficies condylomatum granulata semper et aliter c
lorata adpareat. — Meretrices, quarum pudendum repetitis l
boraverat inflammationibus, vel irritationibus, haud raro lo

(1) Traité complet de l'art des accouchements, Paris 18
ed. 3ème; chap. VIII. — Lauth nouveau manuel de l'anatomis
2e edit. chap. XII.

ntroitum vaginae indurata offerunt atque tumefacta, (*de-eratione leprosa* secundum Kluge adfecta) superficiem qualem, asperam exhibentia, quae facile cum vegetationi-syphiliticis confundi possunt, nisi accuratiore exploratione vitabitur; nonnullis in casibus hanc degenerationem n vel ambo labia majora occupantem vidi, quod etiam ent-Duchatelet (1) observavit; haec tum tactu du-, globosa, quasi hyperthrophica erant, pressione vero um dolorem provocabant, et ubi cutis color mutatus non primo intuitu pro hernia inguinali in labium demissa ri potuerunt; ubi vero cutis ex medicatione locali stimu-, vel propter mali diuturnitatem irritationis particeps tunc labium adfectum tumoris cupreo - rubri, excoriati dum atque pube omnino destituti, speciem offerebat. Multo us labia minora hyperthrophica inveniuntur, vel ambo, ut inter labia majora foras promineant, vel unum tantum, tunc introitum vaginae plerumque quasi occludit; noli n credere, hanc hyperthrophiam solas apud meretrices iri: multis aliis illam in mulieribus honestis vidi, qui-inter partum auxilia tuli. — Orificium urethrae in puel-ccuratiorem postulat explorationem, quum haud raro in radialibus illud circumdantibus, vel in ipso quidem ori-ulcera inveniantur et vegetationes syphiliticae; quare levi ione varias per directiones instituta, illud aperiri necesse Semel tantum mihi fasciculum condylomatum acumina-n in ipsa urethra videre contigit. —

Commissurae denique vaginae, praecipue posterior et sic dicta navicularis, saepe ulcera exhibent, quae tamen superficialibus frenuli rupturis, ex disproportione pudendi s et foeminae, e saltu etc. exortis, commutanda non sunt. l raro enim hanc solam propter affectionem chirurgos, us Berolini inspectio lupanarium commissa est, puellas i infectas ad nosocomium Caritatis misisse memini. Si-modo et in commissura anteriore, in praeputio sic dicto ridis, inque plicis illius ulcera abduntur venerea, quare orandae semper sunt; hac occassione medicus certior potest, clitoridis *sensibilitatem exquisitam*, quam Hal-

(1) Sur la prostitution dans la ville de Paris; champ. III §. V.

ler in physiologia, tanti facit, minime adeo insignem es
neque unquam clitoridem apud meretrices majoris volu
nis, vel magis evolutam, quam foeminas apud honestas,
veni, quare opinio illorum, qui contrarium credunt, rejicier
esse videtur; observatio haec, in plus quam ducentis sc
tis sigillatim a me instituta, a Parent-Duchatelet c
firmatur. (1)

Ad internos vaginae parietes uterique collum inspiecie
dos, *speculum* requiritur *uteri*, cujus inter varias forn
instrumentum Dupuytren emendatum, apice oblique d
cissum manubrioque destitutum, saepissime omnium in no
comio Caritatis adhibitum, praeferendum mihi videtur et s
culo dimidiato Dris Matronae Boivin, quod apertum nimi
vaginae extendit introitum ejusque sphincterem, et instrumen
Ricord, hujus vitii quidem experti, sed nihilominus in
tractione ex vagina, perfacile parietes istius inter margir
acutos suos comprimenti. Omnium incommodissimum vix non e
speculum Colombat multipes, magnitudinis enormis, in
certe exemplari, quod Klug enobis ostendit. — Hunc praecept
rem meum saepe affirmantem audivi, omnia Parisiis confec
uteri specula volumen partium genitalium puellarum Bero
nensium ita superasse, ut omnino introduci non potuerin
quod et alii medici mihi confirmarunt.

Speculum uteri paulo calefactum pistilloque ligneo m
nitum et oleo inunctum, levi motu rotatorio in vaginam i
vehatur, et quidem initio ex parte anteriore et superiore
inferiorem et posteriorem, postea ex parte inferiore ad sup
riorem et posteriorem; operatio haec ubi caute instituitu
dolorem movet nullum, et pistillo remoto lucisque radi
in speculum incidentibus, collum uteri expedite inspici, v
necessaria medicamina, caustica etc., applicari, vel operation
chirurgicae, si in usum veniant institui possunt. Simili mo

---

(1) Libr. citat. — Bis tantum unquam clitoridem solito m
jorem vidi: semel in amphitheatro anatomico Berolinensi bieme
1834, ubi in cadavere vetulae illa circiter duos pollices long
erat, digiti minimi mei extremarum duarum phalangum volume
omnino exhibens; alterum exemplum a J. Müller, praeceptor
meo benevolentissimo et maxime venerando, in praelectionibus d
anatomia pathologica ostenditur; clitoris, volumini capitis homin
adulti fere aequalis, operatione chirurgica ablata erat.

etes inspiciuntur vaginae, instrumentum leni rotatione re-
endo; hi sensim apici speculi oblique descisso se appli-
et minutissimam admittunt explorationem.

IV. CLASSIFICATIO PRIMARIARUM SYPHILIDIS AFFECTIONUM.

Causae differentiarum, quas singula syphilidis offerunt
enomena, persaepe controversias inter medicos provocave-
, neque sat crebra observatio, multos viros variis adfici
iis venereis ab una eademque puella, opinionem penitus
tere potuit, ipsum virus syphiliticum varium esse, prout
hritidem produxerat, vel ulcera, bubonesve; mihi vero
tur haec differentia a sola ***praedispositione*** et ***consti-
one*** infectorum pendere, ita ut in hominibus, in quibus
norrhoeas in genere saepe inveniemus (in scrofulosis ex.
ia, otorrhoeam, leucorrhoeam, catarrhum nasi et pulmo-
chronicum) materia syphilidis contagiosa facilius, genita-
s adplicata, urethritidem provocatura sit; balanitidem,
posthitidem vero in illis, quorum cutis etiam levissima
ione, punctione, morsu insectorum etc., statim extenso
itur partium vicinarum erythemate; sunt alii, quorum, ut
urgi in operationibus praecipue plasticis observare possunt,
s laesiones nunquam prima uniuntur intentione, semper
purant, vel ulcerantur (eine süchtige Haut Germanis);
post coitum impurum plerumque excoriationes et ulcera
rent; quibus denique cutis et membranae mucosae ad ve-
ationes anomalas luxuriantesque opportunae sunt, condyle-
ta exhibebunt, saepe nullo alio syphilidis symptomate sti-
a. Saepe vero aegrotos simul varias formas primarias of-
e — urethritidem cum condylomatibus, urethritidem
n ulceribus, bubonibus et vegetationibus — haud nego.

Affectiones venereas plurimi hucusque auctores divise-
t in ***primarias, secundarias et consecutivas***; hisque
us classibus constitutis, singula statim enumerabant phae-

nomena ab urethritide incipientes usque ad condyloma quae ultima et plerumque sat incomplete exposita inveni Sed talis divisio et nimium lata, et tempus tantum, quo i se manifestaverant phaenomena, considerans, jam eapropt manca haberi debet, quod multae affectiones venereae mo primariae, modo secundariae sunt, neque ipsi medici conse tiunt, quam ad classem referenda sint, ex. gratia condyl mata, a multis secundaria vel consecutiva phaenomena decl rata, Berolini vero, uti in capite sequente exponam, plu mis in casibus mala primaria; neque minus sub judice lis, bubones num primarii sint, an consecutivi? — Qua classificatio a Desruelles (1) proposita, atque structur mutationibus anatomicis innixa partium adfectarum, lon praeferenda mihi videtur; ille nempe omnes syphilidis form ita dividit:

1) ***Forme érythémateuse*** (urethritis, balanitis et orchitis); 2) ***forme ulcérative*** (ulcera); 3) ***forme phle moneuse*** (adenitides venereae); 4) ***forme végétative*** (co dylomata). Hoc divisionis principio plane accepto, ***tres*** t men ego classes statuo:

A. Irritationes ***superficiei*** membranarum cum aucta ***nat rali*** illarum secretione; huc pertinent urethritis, bala tis, posthitis, elytritis et ***orchitis*** denique, quae plurimis casibus nonnisi inflammatio tunicae vaginalis testis pr priae, cum exsudatione liquidi serosi est: hydroce acutissima; quod Bonorden (2) affirmat et Cooper (3) indicare videtur. —

(1) l. c. pag. 134. seqq. —
(2) Die Syphilis etc.; Berlin 1834. pag 201. —
(3) Oeuvres chirurgicales complètes, traduies par Chass gnac et Richelot, 1833; art.: maladies du testicule. — Argumen pro opinione mea desumsi ex forma tumoris in orchitide, ponde illius, dolore magis a distensione tunicae vaginalis subito exsud to liquido, quam compressione ipsius testis tumentis ab inv nero fibroso tunicae albugineae provocato, sicut et A. Coop autumat — et denique a miro fere effectu methodi Fricke orc tidem curandi: ope nempe involutionis testis cum laciniis emplas adhaesivi, (conf. A. Cooper op. et l. citat.: Note des traducteur quam ipse *quinquies* institui et *vicies quater* pleno cum succes adhibitam vidi. Testiculus sanus compressionem nullam toler tumefactus et inflammatus illam et quidem firmissimam, sine u

nflammationes ***parenchymatis*** organorum cum ***puris*** secretione et primitiva vel consecutiva continuitatis laesione: ulcera, bubones. —
Vegetationes anomales in cute et membranis mucosis: condylomata lata, c. acuminata.
Ab una classe ad alteram formae sunt transitoriae: sic ations saepe balanitidem, vel elytritidem comitantes, m Fricke sex statuit species (divisio nullius utilitatis cae), classem nostram primam cun secunda conjun- facile enim illae in ulcera mutantur. Simili modo a secunda ad tertiam ducunt condylomata lata exulce- quae crebro inveniuntur; hic diagnosis non semper fa- est, distinguuntur illa vero ab ulceribus irritatis eleva- (gescheuerte Geschwüre) fundo, qui in ulceribus nun- supra cutis superficiem exsurgit, etiamsi margines alte luntur, marginibusque, qui in ulceribus verticales semper asi cultro acuto abscissi sunt, in condylomatibus ulce- magis inclinati ad fundum supra cutis superficiem ele- n.

V. DE CONDYLOMATIBUS.

Eaedem contradictiones et sententiarum differentiae, quas mnibus syphilidis phaenomenis invenimus, respectu con- natum, tam in scriptis quam in opinionibus medicorum se offerunt. Frequentia hujus symptomatis certe peni- m illius postulat cognitionem, sed ne de hoc quidem ntiunt auctores, utrum malum sit primarium, an secun- m, num consecutivum? Permulti ad hanc ultimam clas- illa numerant, ex gratia Hunter, Wendt, Desruel- alii contra, ut Kluge, Bonorden, Fricke, illa non s saepe primaria esse, quam secundaria, tradunt; equi-

---

, sine dolore sustinebit? Dolor scilicet post applicationem lutionis jam dimidiam post horae partem omnino cessat.

dem saepissime condylomata primaria observavi, urethriti ulcera, excoriationes venereas comitantia, vel etiam sine alio syphilidis symptomate se manifestantia. Kluge nonnullos vidit, ubi nullo coitu exercito illa propullulave nobisque puellae historiam narravit, quae vegetationibus nereis partium genitalium laborabat, quamquam puden omnia adhuc viginitatis integrae signa obtulit; infectio ne ope spongiae marinae producta erat, quam misera sub le sociae (venereae sine dubio) invenit, et ad genitalia menstruationem lavanda mundandaque adhibebat (1); quoque puellas observare contigit, condylomatibus labio pudendi adfectas, quarum vagina omnibus ulceribus vel fl albo maligno destituebatur, quaeque sancte affirmabant, dum se cum viro commercium habuisse. Quapropter op Kluge, condylomata communicari posse per contactum tium tenuiore epidermide obtectarum, vel excoriatarum, cum teria ex superficie condylomatum excreta vestibusque linteo applicata, sat verisimilis videtur et confirmatur q diana observatione aegrorum, qui condylomatibus adfect quadam parte, mox illa et vicinis quoque exhibent, quas positio anatomica contactui immediato submittit: vegetati in uno crenae ani latere brevi cum altero communicantur, bium pudendi unum et alterum inficit, glans penis s scrotum pendentis hujusce partem anteriorem inficit, poste rem vero anus. Kluge sanguinem ex basi condyloma resectorum effluentem novas in cute, quam tetigit, veget nes provocare posse, affirmat, quod et de verrucis vul bus contenditur, sed neque hoc neque alterum adhuc observare licuit. Ejusmodi infectio medici forensis attent maxime digna est, quum haud raro conjuges divortium pter infectionem syphiliticam, ab altero alteri adscrip postulent, etiamsi nemo eorum fidem violaverit connubial sic virum quemdam vidi, condylomata ad anum et scro exhibentem, qui ab uxore secum communicata illa esse questus est; uxor vero, aeque condylomatibus vulvae adf maritum mali sui auctorem esse declaravit; quumque hic etiamsi partium genitalium ejus et foeminae inspectio docuit vi

(1) Conf. quae in capite II, quoad difficultatem penitiore syphilide observationes colligere, dictum est! —

ius affectione sua laborare — omnem concubitum, prae-
uxoris amplexus denegavisset, nil reliquum erat, quam
emoralibus, quae ille a milite quodam emerat, causa in-
onis mariti et postea foeminae imputaretur.

Antequam ad penitiorem condylomatum descriptionem
seamus, inquiramas necesse est, qualem praesentia illorum,
affectionis localis symptoma sunt — in totum excerceat
nismum vim nocentem? Sed quod hucusque numerosae
rvationes mihi demonstraverunt, talis vis nequaquam
tit; vegetationes venereae mere locales remanent, topice
riantur, saepe extensionem adipiscuntur enormem, nulla
n alia in corpore coaffectione producta; videtur prorsus
ilidis sic dictae universalis, eruptio eo difficilius fieri, quo
is condylomata crescunt et concentratio irritationis unum
ocum, salutare quasi impedimentum totius infectioni cor-
s adferre. In statione syphilitica nosocomii Caritatis sal-
omnibus medicis notum est, condylomata, quo diutius
titerint, ante quam aegrotus curam petierit medicam, eo
us symptomata cousecutiva et luem universalem timendam
. Sic juvenem vidi, cujus glans penis et praeputium, jam
ienses ingente copia condylomatum obsita, brassicae ole-
ae botrytidis ad instar apparebant; nihilominus nullae
e affectiones se manifestabant syphiliticae; aeger contra
is omnibus tam floridus et robustus visus est, ut profecto
m declarare potuerimus.

Quaestio altera non minoris momenti haec est: Sintne
lylomata semper symptoma syphilidis, an alia quaelibet
ium genitalium, etiam absque coitu, irritatio, hasce pro-
re queat vegetationes peculiares? Hanc rem nondum ab
oribus examinatam inveni, videtur mihi vero phlogo-
charactere specifico destituta, hoc phaenomeno omnino
re. Desruelles summo ardore flagrans, omnes in sy-
idis decursu malos eventus mercurii tribuere usui, certe
o longius processit affirmans »praecipue curae mercuriali,
ac nunquam necessariam aegrorum admittat munditiem,
que remedia topica excitantia administret, vegetationes cu-
s adscribendas esse, quae nempe aeque ac membranae mu-
sae semper, sicubi irritationis protractae sedes erant, ta-
s producant vegetationes.« »Quare, noster pergit auctor,
eo tempore, quo mercurius majore cum prudentia et ra-

»rius praebetur, ubi major observatur munditics, vel
»tantum adhibetur cura antiphlogistica, numerus condylo
»tum, medicaminibus maxime internis irritantibus provoc
»rum, mirum in modum in nosocomiis imminutus est (
Huic vero Desruelles sententiae meae observationes
nosocomio Caritatis Berolinensi factae, omnino contradic
in quo scilicet mercurius ex toto et quidem longo a tem
rejectus est, munditics ubi tanta, quanta in amplo valet
nario adhiberi potest, observatur et praeter diaetam max
tenuem (»quadrans portionum« — panis albi nimirum ℥jv circ
et jusculi aquosi ℔jß intra 24 horas) interne nilnisi Magn
sulfurica aegrotis exhibetur; nihilominus condylomata ibi
non forma omnium syphiliticarum frequentissima est, qui
dimidia fere pars aegrotorum in nosocomium receptorum
borat, quaeque omnium phaenomenorum difficillime tollun
Puellas nonnullas in statione vidi, quibus per 6, 8, 12 m
ses et amplius, curae internae et externae diversissimae
getationes venereas penitus destruere non potuerunt:
loco excisis statim novae in alio substituebantur.

Si condylomata nonnisi syphilidis proprium essent sy
ptoma, tum demonstrari possit, urethritidem et ulcera vene
aequalem in organismum exercere vim; inveniuntur illa er
et in locis mucosa materie ex urethra profluente madefac
in scroto, ad frenulum praeputii etc., et in partibus ulcera
cumdantibus, vel illis vicinis.

Quod ad divisionem condylomatum, nonnisi duas ag
sco classes principes, charactere anatomico omnino differ
tes, etiamsi formae transitoriae dari videntur: 1) ***Cond
lomata acuminata***, 2) ***Condylomata lata***. — Denor
nationem hanc Kluge proposuit (2); Fricke 6 descri
species (3), quae tamen facillime, praeter speciem tertia
quam videre mihi hucusque non contigit, ad classes duas

---

(1) Traité pratique des maladies vénér. etc, 1837. pag. 5

(2) Conf. Rust, Handbuch der Chirurgie etc.; Bd. V., a
condyloma.

(3) libr. cit. p. 224.; species hae sunt: 1) kegelförmige Co
dylome, 2) hahnenkammförmige, 3) polypenförmige, 4) Cond. d
Urethra, 5) halbkugelförmige, 6) viereckige Condylome.

generales referri possunt; forma enim Fricke 1ma, 4ta et 6ta nonnisi condylomata sunt acuminata, ma- minusve conferta, vel et solitaria plane; forma 5ta (con- nata haemisphaerica) lata nobis sunt. Nomen a Bonor- adhibitum »*verrucae venereae* (1)« rejiciendum videtur, ne terminologia in syphilide jam sat confusa obruatur terminis res nequaquam melius designantibus, nagis, quod Desruelles excrescentias epidermidis syphi- s, omni organisatione carentes, *verrues* nuncupat, quae dum illum in regione praeputii, lamina ejus externa cipue, ad glandem penis etc., interdum etiam in facie niuutur, ubi haud raro magnitudinem et formam cornu gunt; nunquam vero mihi tale quid se obtulit. Idem or formam describit »végétations dermiques« (2), vel to- cutis hypertrophiam, in regione ani se offerentem et dylômes, crêtes-de-coq« nuncupatam, quae nonnisi ex- o esset cutis post accessus hoemorrhoidales; nihilominus apud homines nunquam syphilide affectos tantam cum oribus venereis consecutivis exhibet similitudinem »ut ne ab illis distingui non possit.« Desruelles videtur le *mariscis* sic dictis loqui, quo nomine alii condylo- , alii vero medici, ex. gratia Rust, extensiones cutis in ne ani, a sanguine venarum haemorrhoidalium in telam larem recti intestini extravsato oriundas, notant. Illo- autem diagnosis plerumque, exploratione attentius insti- — haud adeo difficilis est quam secundum verba Des- les crederes: tumores haemorrhoidales enim semper plicas dunt, vel tumores oblongos magis quam rotundos, ele- s, unumque finem semper in membranam mucosam re- trans ani sphincterem continuant; condylomata vero ani em omnibus illis in casibus, quos mihi explorare hu- ue contigit) nunquam ultra sphincterem extenduntur, a magis sunt et superficiem plerumque exhibent papilla- quasi, inaequalem, aliter quam cutis ambiens tinctam et is in aegris materia puriformi tectam; etiam ubi tumo-

---

(1) Die Syphilis etc., 1834; pag. 266.
(2) l. c. pag. 503.

ribus haemorrhoidalibus ipsis insident condylomata, distin
sat expedita est (1).

Quod ad differentiam inter ambas classes principes
getationum syphiliticarum pertinet — condylomata lata c
Kluge *hypertrophiam localem morbosam telae d
moideae* esse censeo, magis ad exanthemata accedente
condylomata vero acuminata, de quibus solis in hoc ca
sermo erit, *evolutione novorum* quasi *elementorum*
cute et membranis mucosis, quae in homine sano exist
non videntur, produci — attenta me docuit indagatio illorum
in vivis, et in praeputiis (organo propter tenuitatem,
luciditatem et reunionem laminae mucosae cum cute ad
lem observationem aptissimo) per operationem circumcisio
in statione syphilitica ablatis mihique a medico illi praepos
traditis, instituta. (2) Haecce circa genesin et evolution
condylomatum acuminatorum inveni:

In ipsa nempe cutis vel membranae pudendi muco
substantia, in urethritide, posthitide ulceribusque veneris, p
vula se ostendunt, numerosa saepe, *puncta alba*, oculo n
sine summa attentione et cutis adfectae forti extensione
conspicua, $\frac{1}{6}'''$ circiter diametrum, vel minorem, haben
quae primo initio, vel cute duriore, sat profunde celant
ita ut, quod crebro a me factum est, cultro tonsorio ac
facile tenuiora possis cutis strata abscindere, antequam
illa pervenias corpuscula alba. Haec plurimis in casibus a
vatim superficiem nonnullarum linearum quadratarum occup
tamque arcte conferta sunt, ut intervallum inter singula
puscula vix ipsorum diametrum superet; coloris albidioris
dentur, quam cutis ambiens, ope vero microscrpii simpl
(Loupe) examinata, pellucidiora inveniuntur, ad granuli ins
amyli aqua calida turgescentis, et ipsa quidem corpuscula
nuta ex particulis aggregatis, substantia multo pellucidi

(1) Conf. Rust Hbch. der Chirurgie, B. V. pag. 210.

(2) Operationem persaepe institutam vidi hieme superi
cultro Rustii concavo, apice contecto (Fistelmesser), qui inter p
putium et glandem introducebatur usque ad coronam — praeput
scindebatur et duo lobi laterales statim forfice vulgari resecal
tur; arteriolae duae vel una ad basin frenuli torquebatur interd
plurimis in casibus vero aquae frigidae ope sanguinis efluxus si
batur; vulnus paucis diebus per primam intentionem reuniebat

iiore et minus alba conjunctis, composita inveniuntur. ldvis corpusculum igitur ex 4, 6, 8 ad 12 constat parti; primitivis, et etiamsi planum fere et compressum quasi nihilominus ope microscopii simplicis consideratum jam ino *fasciculi condylomatum acuminatorum* exhibet iem. — Aliquot post dies, citius interdum, interdum secorpuscula composita volumine paululum augentur, eleur et cutis stratum externum in apicem tenuissimum, umum eum perforando, extendunt; tunc jam tactui et oculo ut parvae adparent eminentiae, condylomatibus acumis plane similes, sed minores adhuc et teneriores. Sensim tationes istae ad unam, 2 ''' et amplius supra cutis superciem emergunt, et vel *solitarios* ostendunt apices, seatos, ubi a Fricke ad speciem primam condylomatum conoidea), (1) numerantur, vel plurimis in casibus *multi* es simul evolvuntur in fasciculumque reuniuntur, ita quiut apices centrum hujusce occupantes longiores sint quam pherici, et quo magis hi a centro distant, eo breviores ant et in ipsa peripheria vix supra cutem elevati appat, quacum adspectum holosericeum communicant. — Apices arios haud raro totam glandis coronam occupantes inveglandularum sebacearum speciem fingentes, ita ut facile icus errare possit, qui non atente membrum examinat aei, quod ego saepe vidi; interdum illos totam superficiem rnam labiorum minorum occupantes observavi, neque ta*papillae elongatae* hujus organi erant, quas Bonorden gravidis invenit (2); secundum descriptionem ejus enim iderim, papillas hasce nonnisi condylomata fuisse conoida. x condylomatum tam solitariorum quam confertorum sem albidior et pellucidior, quam basis est, colorem habens escentem, vel telae cartilagineae animalium juniorum, ita nterdum fasciculus condylomatum revera cum frago, gralutescentia in receptaculo carnoso roseo exhibente, alin offerat similitudinem, vel cum moro immaturo rubete (imaginatio medicorum etiam thymi, porri, brassicae aecae, cristae galli, myrmeciae, fici speciem in vegetatiois syphiliticis invenit.) In condylomatibus magis evolutis

(1) Conf. libr. cit. p. 224.
(2) Libr. cit. pag. 268.

oculo nudo, melius autem microscopio simplici vasa tenu sima sanguifera distingui possunt; centrum condylomatum occupant, circumvolutionibus spiralibus apicem versum adsce dunt et ansa facta (quantum nobis visum est) descendunt.

Condylomata haec acuminata interdum permagnam atti gunt extensionem (1) neque stratum cutis externum per rare videntur, quae nullibi laesae continuitatis offert ves gium; tum superficies illorum nil secernit, ut saepe in pra putio et ad glandem penis invenies; aliis vero in locis, pra cipue inter nates, ubi perpetuae (propter ambulationem, a excretionem etc.,) exposita sunt irritationi, excoriantur et m teriam tenuem, e griseo flavescentem et odoris ingrati sec nunt, quae intervalla inter singulos apices et inter fascic los condylomatum vicinos implet; haec tum granulationu pallidorum instar vulneris suppurantis torpidi adparent [Kl ge] (2); saepe talis mihi vegetationum excoriatarum co junctio, maxime inter nates, ubi pressione planae evadu magnam cum linguae leviter irritatae, muco flavescente c tectae papillisque rubris eminentibus obsitae — superficie, militudinem offerebat. Secundum locum, ubi condyl mata evolvuntur, diversam patiuntur compressionem, f mam eorum aliquantum mutantem; ita vegetationes syphili cae acuminatae ad glandem penis et coronam ejus, ad lar nam internam praeputii, ad frenulum, in ipsa femorum f xura interdum, semper a lateribus comprimuntur, et excr centias angustas, elevatas, dorsum oblongum et angustum e hibentes, ostendunt, cristis gallorum paululum similes Fricke illas ad speciem suam secundam refert; ubi ve condylomata ab apice vel superficie superiore basin vers comprimuntur, tum plana, lata atque extensa fiunt et ab e dem auctore, C. *quadrangularia* nuncupantur; hoc maxi in crena ani perspicuum est. Formarum differentias hasce n quaquam essentiales esse neminem fugit, et talem speciem a cidentalem minime pro basi divisionis agnoscere possumu — condylomata enim acuminata, quae in aegro, cujus pr putium glandem penis semper contegit, cristae galli ad ins

(1) Kluge illa duorum pugnorum volumen aequantia in pu publica observavit; conf. Rust's Handbuch etc., B. V. pag. 207
(2) Ibid. pag. 206.

arent, in eodem aegroto globosa, frago similia fient praeputium retractum tenebit. —

Color condylomatum acuminatorum, quamdiu recentiosunt, et ubi in membranis mucosis propollulaverunt — *lido-roseus* est, ut ad labia minora, introitum vaginae, landem penis; si vero in partibus corio obtectis se ostent, vel plures jam menses perstiterunt, fusciora, cupreoa sunt et singuli apices pallidum amittunt colorem idque agis perspicuum est, quo magis inveteraverunt, ita ut e primo im obtuitu diuturnitas eorum cum probabilitate statui it. In nosocomio Caritatis Berolinensi nos semper ex sola ium genitalium inspectione puellas *Potsdampienses* diguere potuimus, qua in urbe scilicet, militibus numerosis pata, lupanaria non tolerantur, quare affectiones syphili- omnes inter classes urbis pauperiores universales fere , ut Kluge saepissime affirmantem audivi; puellae igitur tae, nulli custodiae commissae, eo usque malum suum ulla cura medica secum ferunt, donec a magistratu forte occasione deprehensae explorentur et infectione detecta linum ad stationem syphiliticam mittantur. Saepe tum pudendi , perinaeum, flexuram et internam superficiem rum enormibus condylomatibus, tumorum cupreo-rubro- excoriatorum ad instar obtecta invenies, et talibus in us infectio plerumque ante menses 6, 8 vel amplius lo- habuerat, puella vero coitum nihilominus cum amatori- exercebat! (1) Berolini rarissime, et quidem tantum in llis clam se prostituentibus, affectiones tam neglectas in- es. — Condylomata ubi parum secernunt, in superficie haud raro, praecipue in crena ani, stratum exhibent o-albescens, ejus plane ad instar, quod in granulationi- vulneris, argento nitrico fuso tactis, primis momentis inve- is: quod adhuc in condylomatibus latis magis perspicuum Nunquam condylomata acuminata genuina, *exulce-* inveni, quod in latis contra creberrrime observatur. —

---

(1) Haecce omnia impulerunt me thesin V. „lupanaria s cum cautelis toleranda esse" apponere, quam opinionem ae adhuc aliae res vindicant; conf. ParentDuchatelet in oper. ato.

Nonnullis in aegrotis perpaucas tantum invenies vegetation venereas, condyloma unum, vel nonnulla sobitaria, vel fas culum minutum in utraque nympha, ad glandem penis; a vero ingentem eorum ferunt copiam, quare non dubito, q ad condylomata producenda peculiaris requiratur aegrom dispositio.

Sedes condylomatam acuminatorum varia est, eaque membranis mucosis aeque ac in corio inveniuntur, amb praeputii laminas, superficiem glandis, frenulum, nates oc pantia, rarius scrotum, ubi vix unquam mihi se obtuleru flexuram praeterea et superficiem internam femorum, maxi in foeminis; superficiem externam et internam labiorum m jorum et minorum, ipsosque vaginae parietes; semel tant fasciculum condylomatum acuminatorum in urethra puell vidi; semel etiam ad dorsum linguae in puero 11 mensi sat robusto et florido, cui in clinico de Gräfe superi hieme, vegetationes similes ad anum resectae sunt. Desru les condylomata nostra acuminata (végétations cellulo-vas laires) in utroque linguae latere ejusque dorso et in p ryngo observavit (1); Kluge ad labia, linguam, palpebr mamillas, in fovea axillari et ad iridem, ubi semper sy toma secundarium erant (2); Fricke semel condyloma c stae galli ad instar tonsillam puellae occupans vidit (3). Saepissime condylomata acuminata in regione pudendi c latis intermixta inveni, ita quidem ut illa magis centru haec vero peripheriam occupent. — De condylomatibus dictis ***iridis***, vel excrescentiis ex fusco rubris ad iridem, q ter vel quater observare mihi contigit, deque condylomati in ***pharynge***, e cinereo-griseis, alio loco tractabimus, ubi mul curam omnium vegetationum syphiliticarum accurat exponemus.

Condylomata acuminata, ubi aegrotus curae locali et ternae rationali subjicitur, brevi tempore marcescunt qu corrugantur et tum facillime cum radice ope vulsellae ex c extrahi possunt, secundum observationem Kluge et Bon

(1) Libr. cit. p. 501.
(2) Rust's Handbuch, B. V. pag. 208.
(3) Annalen der Chir. Abth. etc. B. I. p. 226.

(1); quo facto parvula in hac remanet fovea, aliquot horas disparens nulla relicta cicatrice, quod Kluge pro habet pathognomonico. Mihi hunc curationis processum um observare contigit, haecce vero in praputio juvenis 35 memorati, quod ablatum, per 14 dies macerationi qua frigida quotidie renovata, subjeci — sese obtulerunt aomena: vegetationes, forma sua nequaquam amissa, in am mollem, pulposam, homogeneam quasi, mutatae sunt, gitorum pressione omnino conterebantur et cum dorso anatomici, vel ungue a cute abradi potuerunt; haec penitus illaesa et nonnisi planas exhibens foveas, apparuit.

(1) Die Syphilis etc., 1834; p. 275.

VITA.

Natus sum ego S. Arthur Raffalowitsch, Odessae
die $\frac{13}{25}$ m. Novembris a. MDCCCXVI, patre carissim
A. Raffalowitsch, Caesaraei collegii aedilis Ode
saei membro (1), matre dilectissima Oljga e gen
Ziekinowskoj, quibus adhuc vivis salvisque ga
deo, Deo Maximo Optimo summas agens grati
Primis litterarum elementis per domesticos pra
ceptores imbutus, mense Julii anno MDCCCXX
una cum fratre carissimo Ljeff a beato Winter
numerum alumnorum Lycei Richelieu receptus su
ibique per tres annos virorum doctissimorum Mi
Petrowitsch Rosberg, Nic. Kourliantseff, Ale
Troinitzki, Protohierei Isid. Herbanowski (Pat
Sidor), Plat. Simonowitsch, Vinc. Pachman
Georg. Chrisokus, Iw. Andrejewski, Iw. La
rent, Dm. Shukoff, Ph. Brunn, Fabre, Oertè

(1) Hieme proxime elapsa, peste orientali Odessae grassan
Pater meus munere „curatoris pauperum supremi" fungebatur.

/

Piller, Petr. Ribnikoff, audivi praelectiones, rum professorum omnium erga me benevolentiae quam sum obliturus! — Tribus praemiis, testimonio us gymnasiastici absoluti, nec non permissione sin ri Summae in Patria mea Auctoritatis ad studia emica Berolini continuanda munitus, hanc ad m patre dilectissimo comite me contuli, atque die n. Julii a. MDCCCXXXIV. ab ill. Strauss, t. t. ore magnifico, in numerum civium universitatis lericae Guilelmae receptus, ab ill. Busch, t. t. ino, in album medicorum inscriptus sum.

In alma hac musarum sede per novem seme- haecce frequentavi collegia: Hodegeticen ill. Stef- , Botanicen cum excursionibus demonstrationi- ue ill. Kunth, Chemiam ill. Mitscherlich, Che- n analyticam ill. H. Rose, Mineralogiam Ill. Weiss, cen et Metaphysicen cel. Trendelenburg, Phy- cel. Magnus, Zoologiam Cel. Wiegmannn, ropologiam medicam cel. Ideler, Osteologiam et lesmologiam ill. Schlemm, Anatomiam specia- sensuumque organorum, Physiologiam specialem non generationis, Anatomiam comparatam et Ana- am pathologicam ill. J. Müller; (idem cum ill. lemm, in arte cadavera anatomice secandi duces fuerunt;) Physiologiam comparatam infusoriorum rvationibus microscopicis illustratam cel. Ehren- g; Materiam medicam, nec non artem Formulas concinnandi ill. C. H. Schultz; Pharmacologiam

et Pharmaciam exper. Isensee; Toxicologiam ill. Rose, Pathologiam et Therapiam specialem ill. W: ner, Chirurgiam universam ill. Jüngken, Aciurg et Anatomiam chirurgicam cel. R. Froriep, ar Fascias imponendi cel. Troschel; doctrinam de O bus luxatis et fractis cel. Kluge, Operationes chi gicas frequentiores cel. R. Froriep, Historiam m cinae ill. Hecker; Medicinam forensem practicam Politiam medicam ill. Wagner; artem Obstetrici tam theoreticam quam practicam cel. Kluge.

Ad praxin vero me instituerunt: in clinico dico nosocomii Caritatis per *tria* semestria cel. Wo ill. J. N. Rust et cel. Dieffenbach per totidem mestria in clinico chirurgico ejusdem nosocomii; *bina* semestria ill. de Gräfe in clinico regio chiru ophthalmiatrico Universitatis, ubi nonnullas in v operationes perficere mihi licuit; ill. Jüngken in nico ophthalmiatrico nosocomii Caritatis; praeterea lectulos aegrotorum me instituerunt ill. Bartels clinico medico; cel. Trüstedt in clinico ambulat medico-chirurgico; cel. Barez in clinico station et policlinico infantum aegrotantium; cel. Kluge clinico aegrorum syphiliticorum, idem in clinico ob tricio nosocomii Caritatis, et ill. Busch in clinico stetricio regio Universitatis, stationario et policlini ubi viginti tribus parturientibus, in nosocomio ritatis vero decem, omnia auxilia necessaria a me i lata sunt.

Cursum denique omnium operationum chirurgica-*bis* in cadaveribus perfeci duce ill. Schlemm, triciarum in machina duce ill. Busch et oph-iatricarum duce exper. Angelstein.

Quibus omnibus viris illustrissimis, experientis-, doctissimis, summe de me meritis, maximas, habeo, ago gratias!

Iam vero tentaminibus tam philosophico quam cis, nec non examine rigoroso rite exantlatis, fore ut Doctoris Medicinae et Chirurgiae in me us conferatur.

THESES DEFENDENDAE.

I. *Syphilidis formas primarias characteres habere [illegible] thognomonicos contendo.*

II. *Mercurius in curanda lue venerea egregium [illegible] medium.*

III. *Regimen accuratissime ad statum aegroti acc[illegible] modatum et fiducia hujus arti curantis medici [illegible] bita, inter efficacissima in morbis acutis medicam[illegible] referendae sunt.*

IV. *Dislocationem Cataractae Extractioni ejus pr[illegible] fero, Iridodialysin vero iridictomiae postponend[illegible] censeo.*

V. *Lupanaria certis cum cautelis toleranda sunt.*

VI. *Divisio medicorum in Puros sic dictos Medicos et Chirurgos plane rejicienda.*

VII. *Auscultatio et Percussio thoracis ad utilissima [illegible] arte medica novissimorum temporum inventa re[illegible] rendae sunt.*